

Avenas



GAVIOTA

ESTRELLA

ÁGUILA

TEXAS

Forrajera de alta productividad con un ciclo diferenciado de productividad y requerimientos de agua que los otros cereales menores. Se cultiva especialmente en valles, zonas frías y zonas con climas relativamente frescos con alta humedad, desde los 2000 hasta los 4500 msnm. Desarrolla en distintos tipos de suelo, y alcanza su mayor producción en suelos francos o franco arcillosos.

ÉPOCA DE SIEMBRA

La época de siembra más adecuada en zonas altura, inicia en la temporada de lluvias. En los valles se puede sembrar hasta la primera quincena del mes de marzo. Siembras más tardías pueden verse afectadas en el rendimiento y por presencia de heladas.

DENSIDAD DE SIEMBRA

Se recomienda una densidad de siembra de 80 kg/ha. Se pueden asociar con leguminosas forrajeras anuales (vicia dasycarpa y arveja) para mejorar la calidad del forraje, en cuyo caso se disminuye la densidad de siembra a 70 kg/ha y para la leguminosa a 15 kg/ha.

APROVECHAMIENTO

El momento oportuno de cosecha del forraje para conservar como heno o ensilaje es en estado de leche a masa suave del grano.



Ganado comiendo avena asociado con vicia dasycarpa



Forraje de avena cultivada en regiones altas



Web: www.sefosam.com.bo
email: info@sefosam.com.bo

Ventas:



71407181

Asistencia técnica:



71730243